

Medikament	Mögliche Nebenwirkungen	Empfehlung
Ablify	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Aclasta	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Activele	selten Nesselsucht, Hautausschlag, Körperbehaarungszunahme	2
Adalat	phototoxische Reaktionen	1
Aggrenox	Ausschlag, Überempfindlichkeitsreaktionen	2
Aldactone	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Alendronsäure	schwere Haut- und Überempfindlichkeitsreaktionen, Hautausschlag, Entzündung	1
Allegro	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Allegro Fravateitan	anormales Temperaturempfinden, Empfindungsstörungen	1
Allopurinol	schwere Haut- und Überempfindlichkeitsreaktionen, Hautausschlag, Entzündung	1
Amisulprid	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Amlodipin	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Amytriptylin	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Anafranil	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Antirhumatismal	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Aranesp	allergische Reaktionen, Hautrötung	2
Arthrothec	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Atenolol	Überempfindlichkeitsreaktionen	2
Aurorix	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Azafalk	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Balanca	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Beloc-Zok	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Bisoprolol	Durchblutungsstörungen, Empfindungsstörungen	1
Blopresid	Nesselsucht, Hautausschlag	1
Capto Comp	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Capval	Hautrötung, Nesselsucht	1
Carbamazetin	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Carbimazol	allergische Hautreaktionen	2
Carmen	Hautrötung mit Hitzegefühl	2
Cell Cept	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Cipralax	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Cipramil	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Ciprofloxacin	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Citalich	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Citalopharm	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Clomifen	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Clomipramin	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Clonidin	allergische Reaktionen, Hautrötung	2
Clozapin	Überempfindlichkeit/Hautausschlag/ Haarfollikelentzündung	1
Cotrim	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1

1 = Behandlung nur möglich nach Absetzen des Medikamentes bzw. ausdrücklichem OK des Arztes
 Wartezeit bis zur Behandlung: 2 Wochen bei Kurzeiteinnahme, 4 Wochen bei Einnahme ab 10 Tagen
 2 = Sensibilitätstest ist notwendig, um die Reaktion der Haut beurteilen zu können

Medikament	Mögliche Nebenwirkungen	Empfehlung
Cymbalt	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Cymbalta	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Dafalgan	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Decortin	Haut wird dünner und reagiert stärker	1
Desmin 20	allergische Hautreaktionen, Durchblutungsprobleme	2
Detrusitol	Haut wird dünner und reagiert stärker	1
Diclofenac	erhöhte Photosensibilität	1
Diovan	Hautausschlag, Überempfindlichkeitsreaktionen	2
Dolormin	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Dormicum	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Doxepin	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Doxybene	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Doxycyclin	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Doxydyn	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Dynorm	allergische Hautreaktionen, Nesselsucht	1
Eins alpha	allergische Hautreaktionen	2
Elontril	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Enalapril	Blutdrucksenkung/ Hautreaktionen	1
Enbrel	starke Reaktionen an der Injektionsstelle, Hautinfektion, Hautausschlag	1
Epiduo	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Equilibrin	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Eryacnen	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Erythromycin	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Esitrix	chronische Photosensibilität	1
Esomep	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Exforge	Juckreiz, Überempfindlichkeit	2
Fenofibrat	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Ferro sanol	allergische Hautreaktionen	2
Fluoxetin	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Flutamid	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Folsäure	schwere Haut- und Überempfindlichkeitsreaktionen, Hautausschlag, Entzündung	1
Forsteo	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Fortzaar	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
FSME IMMUN	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Furosemid	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Gardasil	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Glianimon	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Glivec	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Glucobay	Überempfindlichkeitsreaktionen	2
Glucophage	Hautreaktionen, Nesselsucht	1

1 = Behandlung nur möglich nach Absetzen des Medikamentes bzw. ausdrücklichem OK des Arztes

Wartezeit bis zur Behandlung: 2 Wochen bei Kurzeiteinnahme, 4 Wochen bei Einnahme ab 10 Tagen

2 = Sensibilitätstest ist notwendig, um die Reaktion der Haut beurteilen zu können

Medikament	Mögliche Nebenwirkungen	Empfehlung
Haldon	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
HCT	photoallergischer akut auftretender Hautausschlag (Exanthem)	1
Herz Ass	Entzündungen, Nesselsucht, Überempfindlichkeitsreaktionen	1
Hypercum	führt zu erhöhter Lichtsensibilität	1
Imurek	Phototherapie meiden	1
Indapamid	Hautrötung, Nesselsucht, allergische Reaktionen	1
Inegy	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Insuman rapid	Hautausschlag, allergischen Reaktionen	2
Interferon	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Isotretinoin	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Jarsin	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Jatrosom	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Johanniskraut	erhöhte Photosensibilität, Hautausschlag, Überempfindlichkeit	1
Jurnista	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Laif	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Lamotrigin	Hautausschlag	2
Levemir	Hautausschlag, allergischen Reaktionen	2
Lisi Lich Comp	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Lisihexal	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Ludiomil	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Lyrica	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Marcumar	gestörtes Verhalten der Durchblutung	1
MAXALT	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Medikinet	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Meloxicam	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Metamixol	Brennen, Juckreiz, Rötung	2
Metex	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Metformin	Hautausschlag, Überempfindlichkeitsreaktionen, Nesselsucht	1
Meto hexal	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Metoprolol	allergische Hautreaktionen, Empfindungsstörungen	2
Metrotrexat	erheblichen Überempfindlichkeitsreaktionen	1
Minocyclin	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Mirena	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Moxomidin	allergische Hautreaktionen, Missempfindungen	2
MST	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
MTX Hexal	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Mydocalm	allergischen Reaktionen, Hautausschlag, Überempfindlichkeit	1
Nadixa Creme	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Nexium	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Nitrofurantoin	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1

1 = Behandlung nur möglich nach Absetzen des Medikamentes bzw. ausdrücklichem OK des Arztes
 Wartezeit bis zur Behandlung: 2 Wochen bei Kurzeiteinnahme, 4 Wochen bei Einnahme ab 10 Tagen
 2 = Sensibilitätstest ist notwendig, um die Reaktion der Haut beurteilen zu können

Medikament	Mögliche Nebenwirkungen	Empfehlung
Novalglin	allergischen Reaktionen, Hautausschlag, Überempfindlichkeit	1
Nuva Ring	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Omeprazol	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Opipramol	Überempfindlichkeitsreaktionen	2
Orfilril	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Oxazepam	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Palladon	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Pantazol	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Pantoxol	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Paroxat	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Paroxetin	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Penicillin	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Perazin	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Perindopril	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Plavix	blutverdünnend, Hautausschläge	1
Plopress	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Prednisolon	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Procoralan	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Prograf	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Propa	Durchblutungs- und Empfindungsstörungen	2
Provas	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Quensyl	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Quilonum	Überempfindlichkeit/Hautausschlag/Haarfollikelentzündung	1
Quilonum	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Ramiplus	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Ramipril	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Rantodil	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Remicade	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Roaccutan	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Roferon Alpha	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Sertralin	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Sertralon	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Simva	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Simva Basics	Hypersensitivitätssyndrom	1
Simvadura	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Simvastatin	Hautausschlag, Überempfindlichkeitsreaktionen, erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Skid	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Sortis	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Sotalex	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Strovac	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1

1 = Behandlung nur möglich nach Absetzen des Medikamentes bzw. ausdrücklichem OK des Arztes

Wartezeit bis zur Behandlung: 2 Wochen bei Kurzeiteinnahme, 4 Wochen bei Einnahme ab 10 Tagen

2 = Sensibilitätstest ist notwendig, um die Reaktion der Haut beurteilen zu können

Medikament	Mögliche Nebenwirkungen	Empfehlung
Sulfasalzin	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Tamoxifen	schwere allerg. Reaktionen, Haarausfall Überempfindlichkeitsreaktionen	1
Tamsublock	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Tavanic	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Tavor	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Taxilan	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Td-Pur	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Thomapyrin	Überempfindlichkeitsreaktionen, Hautrötung	2
Thyronajod	seltene allergischen Reaktionen	2
Thyroxin	seltene allergische Reaktionen	2
Timox	Überempfindlichkeitsreaktionen	2
Topamax	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Tramadol	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Trancolong	allergische Reaktionen, Hautausschlag, Überempfindlichkeit	1
Trevilor	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Trimiparin	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Valdoxan	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Valette	Hautausschlag, Hypertrichose	2
Valtrex	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Venlafaxin	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Vesikur	trockene Haut, allergische Reaktionen	2
Viagra	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Vitamin B	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Vivinox	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Voltaren	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Xipamed	chronische Lichtempfindlichkeit	1
Zacpac	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Zeldox	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Zithromax	extrem lange Verweildauer im Blut, starke Überempfindlichkeitsreaktionen	1 (immer 4 Wochen)
Zocor	erhöhte Lichtempfindlichkeit	1
Zoladex	allergische Reaktionen, Hautausschlag, Überempfindlichkeit	1

1 = Behandlung nur möglich nach Absetzen des Medikamentes bzw. ausdrücklichem OK des Arztes

Wartezeit bis zur Behandlung: 2 Wochen bei Kurzeiteinnahme, 4 Wochen bei Einnahme ab 10 Tagen

2 = Sensibilitätstest ist notwendig, um die Reaktion der Haut beurteilen zu können